



# Corso di Laurea in Scienze Economiche L-33

Matematica per l'Economia  
SECS-S/06 - 8 CFU

**Prof. Massimiliano Ferrara**

[massimiliano.ferrara@unirc.it](mailto:massimiliano.ferrara@unirc.it)  
[massimiliano.ferrara@unibocconi.it](mailto:massimiliano.ferrara@unibocconi.it)


A.A. 2022/2023

Geoff Renshaw

# Matematica. Metodi e strumenti per l'economia

Edizione italiana a cura di Massimiliano Ferrara

## Capitolo 13 – Derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche e loro possibili applicazioni



 Egea

# Derivata della funzione esponenziale in base e

Enunciamo, senza dimostrare:

- Se  $y = e^x$ ,  $\frac{dy}{dx} = e^x$  (Regola 13.1)

Generalizzazione:

- Se  $y = e^{f(x)}$ ,  $\frac{dy}{dx} = e^{f(x)} f'(x)$  (Regola 13.2)

Esempio 1:  $y = 10e^{x^2+3x} + 50$ ;  $\frac{dy}{dx} = 10e^{x^2+3x}(2x + 3)$

Esempio 2:  $y = ae^{rx}$ ;  $\frac{dy}{dx} = ae^{rx}(r) = rae^{rx}$

# Derivata della funzione logaritmo in base e

Enunciamo, senza dimostrare:

- Se  $y = \ln x$ ,  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$  (Regola 13.3)

Generalizzazione:

- If  $y = \ln f(x)$ ,  $\frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)}{f(x)}$  (Regola 13.4)

Esempio:  $y = \ln(x^2 + 3x)$ ;  $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+3}{x^2+3x}$

# Tassi di crescita discreta e continua

Supponiamo che una variabile  $y$  sia legata al tempo,  $x$ , tramite una generica funzione  $y = f(x)$

## Crescita discreta su un periodo

$x$  assume solo i valori 1, 2, 3,... (anni o altra unità temporale)

- Crescita assoluta dall'anno 0 all'anno 1:  $\Delta y = y_1 - y_0$
- Tasso di crescita (= crescita per unità di tempo):  $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \left( = \frac{y_1 - y_0}{1} \right)$
- Tasso di crescita proporzionale:  $\frac{\frac{\Delta y}{\Delta x}}{y_0} = \frac{1}{y_0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \left( = \frac{y_1 - y_0}{y_0} \right)$

(Regola 13.6)

La Regola 13.6 si può ricavare anche dalla formula di crescita composta:

$$y = a(1 + r)^x \quad (\text{Regola 10.4})$$

Per la crescita su un periodo,  $x = 1$ , per cui  $r = \frac{y}{a} - 1$

Nella Regola 13.6 abbiamo  $y_1 = y$  e  $y_0 = a$ , perciò nella Regola 10.4

$$r = \frac{y}{a} - 1 = \frac{y-a}{a} = \frac{y_1 - y_0}{y_0} \quad (\text{come in Regola 13.6})$$

Attenzione! La Regola 13.6 va usata solo per i calcoli sulla crescita su un periodo. Un errore comune è di calcolare, per esempio, una crescita di 10 anni con la formula  $r = \frac{1}{10} \left( \frac{y_{10} - y_0}{y_0} \right)$

Questa è una **media aritmetica**. Essa assume una crescita **assoluta** costante. (Esempio 13.4)

Per periodi più lunghi va usata la Regola 10.4, che fornisce la **media geometrica** del tasso di crescita su più periodi. Essa assume una crescita **proporzionale** costante.

# Crescita continua

Richiamiamo la Regola 13.6: la crescita proporzionale su 1 periodo è  $\frac{1}{y_0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

Supponiamo ora che  $x$  vari con continuità, cosicché  $y = f(x)$  è una curva

«liscia» anziché una funzione a gradino. Nella Regola 13.6  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  è adesso il rapporto incrementale e varia con il valore di  $\Delta x$ . Manca perciò di precisione come misura della crescita. Per risolvere il problema:


Poniamo  $\Delta x \rightarrow 0$ . Allora  $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \frac{dy}{dx}$  e la Regola 13.6 diventa:

Tasso di crescita proporzionale istantaneo:  $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx}$  (Regola 13.7)

(trascuriamo i pedici su  $y$ ) Vedi la fig.13.4.



**Figura 13.4** Misura del tasso di crescita istantaneo di una variabile continua



$\frac{1}{y_0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$  misura il tasso di variazione proporzionale medio (= tasso di crescita medio) fra  $x_0$  e  $x_1$ .

Questo tasso è uguale alla pendenza della corda  $JK$  divisa per la distanza  $JM$ .

$\frac{1}{y_0} \frac{dy}{dx}$  misura il tasso di variazione proporzionale istantaneo (= tasso di crescita istantaneo)

in  $x_0$ . Questo tasso è uguale alla pendenza della tangente  $RS$  divisa per la distanza  $JM$ .

# Un caso speciale di crescita continua

La Regola 13.7 è valida per ogni funzione  $y = f(x)$

Se  $y$  cresce a un tasso proporzionale costante,  $y = f(x)$  diventa

$$y = ae^{rx} \quad (\text{Regola 12.2b})$$

Dalla Regola 13.2,  $\frac{dy}{dx} = rae^{rx}$

Perciò nella Regola 13.7 abbiamo:

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y} rae^{rx} = r \quad \text{Tasso di crescita istantaneo} \quad (\text{Regola 13.8})$$

# Ancora sui grafici semi-logaritmici

Nel Capitolo 12 abbiamo visto che se una variabile cresce a un tasso (proporzionale) costante, il grafico che riporta  $\ln y$  sull'asse verticale è lineare. Ora siamo in grado di dimostrarlo.

Premessa: (1) Se  $A = B$ , allora  $\frac{dA}{dx} = \frac{dB}{dx}$

(2) Se  $y = f(x)$ ,  $\ln y = \ln f(x)$ , dunque

$$\frac{d(\ln y)}{dx} = \frac{d \ln f(x)}{dx} = \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{f(x)} f'(x) = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} \quad (\text{usando la Regola 13.4})$$

Ossia:  $\frac{d(\ln y)}{dx} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx}$  (Regola 13.5)

Al primo membro abbiamo la pendenza su una scala logaritmica naturale, al secondo il tasso di crescita proporzionale istantaneo.

# Un caso particolare importante

La Regola 13.5 è valida per qualsiasi funzione. Un caso particolare è quando  $y$  cresce a un tasso costante:  $y = f(x)$  diventa  $y = ae^{rx}$ .

Dalle Regole 13.7 e 13.8 sappiamo che il tasso di crescita istantaneo per questa funzione è  $\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = r$ .

Passando ai logaritmi l'equazione  $y = ae^{rx}$  otteniamo

$$\ln y = \ln(ae^{rx}) = \ln a + rx \quad \text{da cui} \quad \frac{d(\ln y)}{dx} = r$$

Ciò conferma la Regola 13.5 in questo caso, e anche che la pendenza con la scala logaritmica sull'asse verticale dà il tasso di crescita.

# Scala logaritmica ed elasticità

Finora abbiamo considerato la scala logaritmica solo per  $y$ , con  $x$  = tempo. Ora consideriamo i casi in cui su entrambi gli assi c'è una variabile economica. Esempio:

Funzione di domanda  $q = Ap^{-\alpha}$ , con derivata:  $\frac{dq}{dp} = -\alpha Ap^{-\alpha-1}$

L'elasticità della domanda è:

$$\frac{p}{q} \frac{dq}{dp} = (-\alpha Ap^{-\alpha-1}) \frac{p}{q} = -\alpha$$

Passiamo ai logaritmi:  $\ln q = \ln(Ap^{-\alpha}) = \ln A - \alpha \ln p$

La derivata è:  $\frac{d(\ln q)}{d(\ln p)} = -\alpha$  (Regola 13.10)

Che cosa abbiamo appreso dalla slide precedente?

- Con scala logaritmica su **entrambi** gli assi la pendenza misura l'elasticità.
- L'esempio precedente è un caso specifico di una regola generale. La pendenza (= elasticità) non deve per forza essere costante.

NOTA: Se  $x = \text{tempo}$ , non ha senso usare una scala logaritmica sull'asse  $x$ !